

ZEDOÁRIA

Nome científico: *Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe.

Sinonímia científica: N/A

Nome popular: Zedoária, falso açafão, tumeric.

Família: Zingiberaceae.

Parte Utilizada: Rizoma.

Composição Química: Curcumenona (ciclopropanosesquiterpeno) e espirolactonas (curcumanolide A e curcumanolide B); óleos voláteis (cineol, canfeno, cânfora, zingibereno, α -pineno, zederono, curcumeneol, curculono, furanodienono, isofuranodienono); pigmentos curcumina; amido; resinas; lactonas; taninos, mucilagem; albuminoides; vitaminas: B1, B2, B6; sais minerais: cálcio, manganês, sódio, ferro, potássio, fósforo.

Formula molecular: N/A

Peso molecular: N/A

CAS: N/A

DCB: N/A

DCI: N/A

Planta perene, ereta, muito folhosa. O rizoma – com a superfície cinza-azulada e o interior branco-amarelado, é alongado e curvado para baixo, tem inúmeras ramificações laterais finas. As folhas saem diretamente do rizoma, chegam a 1m de comprimento e até 20 cm de largura. As hastes florais surgem após a queda das folhas, com inflorescências em forma de espiga de até 15 cm de comprimento verde-pálido, com rosa nas pontas. O fruto é uma cápsula lisa, irregularmente deiscente, as sementes elípticas têm um arilo branco. A planta toda tem sabor amargo e cheiro de cânfora com notas de cardamomo e gengibre. É nativa da Índia, no Brasil é mais

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

conhecida pelo uso de seus rizomas, que devem ser colhidos quando a planta perde totalmente suas folhas após a floração.

Indicações e Ação Farmacológica

Tem ação tônico estimulante, carminativo, expectorante, diurético, rubefaciente, calmante, colerético, colagogo, antisséptica e antifúngico. Sendo indicado para gastrite, úlceras, mau hálito, intoxicação alimentar, flatulências, gota, cálculos renais, hipercolesterolemia, insônia, tosse, bronquites e piorreia alveolar.

Atua principalmente no trato digestivo, promovendo seu bom funcionamento, pois inibe a secreção do ácido gástrico e aumenta a secreção biliar, evitando a azia e a má digestão, prisão de ventre, cólicas e gases intestinais e estomacais. É indicado na prevenção e tratamento de úlceras gástricas e duodenais, bem como nas doenças de fígado (cálculo biliar e colesterol alto). Atua contra o mau hálito, proporcionando uma agradável e duradoura sensação de frescor em todo o trato digestivo superior.

É um poderoso depurativo do sangue ativando a circulação e promovendo ampla desintoxicação do organismo.

Devido a sua ação rubefaciente é utilizado na tosse e bronquite, aumentando a irrigação sanguínea do local, provocando dilatação dos vasos. Do extrato alcóolico da zedoária foram isolados três compostos com atividade antibiótica, atuando contra o *Trichophyton rubrum*. Na piorreia alveolar auxilia detendo a produção do elemento TXA2, o qual é o principal responsável pela hiperemia na gengiva. Também é usado como fitocosmético (dentífrico).

Toxicidade/Contraindicações

Não deve ser utilizada nos três primeiros meses de gravidez e durante a lactação.

Podem ocorrer diarreias, inchaços e dores abdominais nos primeiros dias de ingestão.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br

Deve ser administrada apenas em doses terapêuticas para se evitar os efeitos indesejáveis de uma superdosagem e em caso de hipersensibilidade descontinuar o uso. A superdosagem pode provocar irritação da mucosa estomacal e úlceras. Evitar utilizar mais que 15g diárias.

Dosagem e Modo de Usar

Uso interno

- **Rasura:** duas colheres de sopa para um litro de água, tomar de 50 a 200 ml ao dia.
- **Extrato seco:** 80 mg duas vezes ao dia.
- **Pó:** 1g por dose, duas a três vezes ao dia.
- **Tintura:** 5 a 25 ml ao dia.
- **TM:** 20 a 50 gotas ao dia.

Uso externo

- **Extrato fluido:** concentração mínima de 20 mg/ML como antifúngico.

Referências Bibliográficas

ÁVILA, L. C. **Índice terapêutico fitoterápico – ITF**. 2 ed. Petrópolis, RJ, 2013

NICOLETTI, M.A.; et al. Estudo da atividade antimicrobiana do extrato fluido da *Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe – Determinação da concentração mínima inibitória. **Rev. Bras. Farm.**, vol. 84, n. 2, p. 39-41, 2003.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. **Herbarium compêndio de fitoterapia**. 3 ed. Curitiba, 1997.

Vendas

(19) 3429 1199
Estrada Vicente Bellini, 175

vendas@florien.com.br
www.florien.com.br