

SlimCarb®



reduz a absorção
de gorduras



Inibe a enzima
lipase pancreática



Efeito antiadipogênico



100%
NATURAL



Glúten
free



DUPLA
PADRONIZAÇÃO



Vegano



GMO
free



Kosher

 **Florien**



SLIMCARB® é um fitoativo exclusivo da *Salacia reticulata* padronizado em 20% saponinas triterpenoides e 1% mangiferina, que apresenta triplo bloqueio enzimático e ação antiadipogênica, favorecendo a redução da absorção de gordura e auxiliando no controle do peso corporal.

REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DE GORDURAS E CARBOIDRATOS

Os efeitos do SLIMCARB® na inibição da absorção de carboidratos estão relacionados à redução da atividade das enzimas α -amilase e α -glicosidase, reduzindo a absorção de amido e glicose. A enzima lipase pancreática é responsável pela quebra de 50 a 70% das gorduras ingeridas na dieta. SLIMCARB® atua diretamente nesta enzima, inibindo a sua atividade, e reduzindo a absorção das gorduras ingeridas.

ESTUDOS




Estudo clínico controlado por placebo tipo *cross over* ou com inversão dos tratamentos no mesmo grupo, foram avaliados 20 indivíduos (homens e mulheres - idade média de 58 anos) e portadores de diabetes do tipo 2, com elevação da hiperglicemia de jejum, mas sem a implementação de medicamentos convencionais hipoglicemiantes. (KAJIMOTO OKS et al., 2015).

OS INDIVÍDUOS FORAM DIVIDIDOS EM DOIS GRUPOS:

Grupo 1 6 semanas tratados com o fitoativo e 6 semanas seguintes com placebo.

Grupo 2 6 semanas tratados com o placebo e 6 semanas seguintes tratados com o fitoativo.

Os resultados indicam que o fitoativo proporcionou redução significativa da glicemia de jejum (Figura 1), hemoglobina glicada (Figura 2) e índice de massa corporal (Figura 3).



VOCÊ SABIA?

SLIMCARB® auxilia a reduzir a expressão PPAR γ , prevenindo a maturação dos adipócitos e dificultando seu acúmulo e crescimento. Contribuindo assim, para o gerenciamento do peso.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Ingerir uma dose de 200 mg de **SLIMCARB®**, duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições.

CONTRAINDICAÇÕES

A administração oral de **SLIMCARB®**, nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade (deve ser utilizado com cautela em indivíduos que já fazem uso de hipoglicemiantes). **SLIMCARB®** não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

REFERÊNCIAS

KAJIMOTO OKS et al. Effects of a diet containing *Salacia reticulata* on mild type 2 diabetes in humans a placebo controlled, cross over trial. *J Jpn Soc Nutr Food Sci.*, 2000; 53(5): 199–205.

KKIU A, SUBASINGHE S. *Salacia reticulata* weight: a review of botany, phytochemistry and pharmacology. *Tropical Agricultural Research & Extension* 13(2): 2010.



florien.com.br

/florien.fitoterapia

@florienfitoativo

Vendas: 19 3429 1199



*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).