

## VENLAFAXINA HCL (P.344)

(Depressão e transtorno de ansiedade generalizada)

**Nome científico:** Cloridrato de Venlafaxina

**Nome popular:** Venlafaxina

**Formula molecular:** C<sub>17</sub>H<sub>27</sub>NO<sub>2</sub> . HCL

**Peso molecular:** 313,87 g/mol

**CAS:** 99300-78-4

**DCB:** 09113

**Fator de equivalência:** 1,13

Venlafaxina é um fármaco antidepressivo pertencente a um grupo de medicamentos chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRS ou SSRI). Assim, atua através de triplo mecanismo de ação: inibindo de forma potente a recaptação de serotonina e norepinefrina e inibindo de forma fraca a recaptação de dopamina. Através dessas atividades, esse fármaco é utilizado primariamente em síndromes depressivas de grau variável, contudo seu uso também pode ser estabelecido para a resolução de casos de transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos de ansiedade generalizada.

### Indicações e Ação Farmacológica

A venlafaxina e a O-desmetilvenlafaxina (ODV, desvenlafaxina), seu metabólito ativo, atuam com ação antidepressiva pela potencialização da atividade neurotransmissora no Sistema Nervoso Central (SNC).

#### Vendas

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florien.com.br](mailto:vendas@florien.com.br)  
[www.florien.com.br](http://www.florien.com.br)

Após a administração por via oral atinge o pico de concentração após 2 horas, sendo um fármaco rapidamente absorvido. Sua ação no SNC visa aumentar os níveis das substâncias em que há a inibição da recaptação, ou seja há o aumento dos níveis de serotonina, norepinefrina e dopamina, ocasionando a melhora sintomática da depressão e ansiedade.

Embora seu pico de concentração seja atingido após 2 horas, seu início de ação terapêutica ocorre entre 3 a 4 dias de uso, portanto a melhora dos sintomas ocorre durante esse período de tempo.

### Contraindicações

A administração de Venlafaxina pode levar ao aparecimento de náuseas, diarreia, erupções cutâneas, anorexia, ansiedade, insônia, secura da boca e astenia.

Seu uso deve ser empregado com cautela em pacientes que apresentam insuficiência renal e/ou hepática.

### Dosagem e Modo de Usar

Ingerir uma dose de 75 a 225 mg de Venlafaxina, uma vez ao dia, em associação a alimentos.

### Referências Bibliográficas

RAZZOUK D. Venlafaxina e interações medicamentosas. Revista brasileira de medicina. 2014. 71: 4-9.

SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

#### **Vendas**

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florien.com.br](mailto:vendas@florien.com.br)  
[www.florien.com.br](http://www.florien.com.br)

ANFARMAG. MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.

**Vendas**

(19) 3429 1199  
Estrada Vicente Bellini, 175

[vendas@florien.com.br](mailto:vendas@florien.com.br)  
[www.florien.com.br](http://www.florien.com.br)